

HASZNÁLATI UTASÍTÁS (* egyben címke 200 ml-es és 1 literes kiszereléshez)
Neostomosan koncentrátum A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és gyártó:
CEVA-PHYLAXIA Zrt. (1107 Budapest, Szállás u. 5.)

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Neostomosan koncentrátum A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Transzmix	0,25 g
Tetrametrin	0,025 g
Segéd-és vivőanyagok ad	5 ml

4. JAVALLAT(OK)

Sarcoptes rühösség, Otodectes fülrühösség, lokalizált demodicosis, bolhásság, tetvesség és kullancs fertőzöttség megelőzésére és kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a készítmény hatóanyagaival, vagy bármely segédanyaggal vagy vivőanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismert. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Külsőleges alkalmazásra.

Lemosással, fűrösztéssel vagy permetezéssel történő kezeléshez a koncentrátumot 1:200 arányban kell hígítani (5 ml készítmény/1 liter víz). Bolhásság és tetvesség esetén a teljes testfelületet és az állatok közvetlen környezetét is permetezni kell. A kezelést 7 nap múlva meg kell ismételni.

A kullancsok a kezelés után néhány órán belül lehullanak.

Sarcoptes rühösség és lokalizált demodicosis esetén a kezelést 10 naponként addig kell ismételni, amíg két egymást követő bőrkaparék vizsgálat negatív eredményt nem ad.

Otodectes fülrühösség esetén a munkaoldatot a fülkagyló és a külső hallójárat elváltozást mutató területeire juttatjuk. Mindkét fület kezelni kell. A kezelést 7 nap múlva meg kell ismételni.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

Élelmiszertermelő állatok a készítménnyel nem kezelhetők.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

25°C alatt, fénytől védve tárolandó.


Fagyástól óvni kell. Hőhatástól védve, gyúlékony anyagoktól távol tartandó.

Csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

Az előírás szerinti hígítás után azonnal felhasználandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A kutyákat a kezelés után 3 napig nem szabad úsztatni.



Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A készítmény tűzveszélyes! Használata során védőruha, védőkesztyű, védő szemüveg, permetezés esetén maszk viselete javasolt. Kerülni kell, hogy a koncentrátum vagy a munkaoldat a munkát végzők szemébe, bőrére jusson, vagy a permetlét belélegezzék. A bőrre vagy a szembe került anyagot bő vízzel mossuk le, továbbá a készítmény szembe jutása vagy lenyelése esetén a használati utasítással együtt haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség és laktáció idején.

Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható.

Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

Túladagolás

Toxikózis esetén nyálzás, hányás, hasmenés, remegés, izgatottság/tompultság jelentkezhet. Görcsök esetén diazepam adása javasolt.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Halakra és méhekre mérgező. A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint a keletkező hulladékokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

A Neostomosan koncentrátum A.U.V. nem kerülhet természetes vizekbe, mert veszélyes lehet a halakra és más vízi élőlényekre.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2014. március 21.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓKKiszerezési egységek:

5 x 5 ml üveg ampullában, papírdobozban.

100 x 5 ml üveg ampullában, papírdobozban.

200 ml, polietilén kupakkal lezárt polietilén flakonban.

1 liter, polietilén kupakkal lezárt polietilén flakonban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

Vény nélkül. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

A 200 ml-es és 1 literes készítmény külső csomagolásán feltüntetendő további adatok:

3139/2/12 NÉBIH ÁTI (200 ml)

3139/3/12 NÉBIH ÁTI (1 l)

EXP

Lot

200 ml

1 liter

