

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Stresnil 40 mg/ml oldatos injekció sertéseknek A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Elanco GmbH

Heinz-Lohmann-Str. 4. 27472 Cuxhaven, Németország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Elanco France S.A.S.

26 Rue de la Chapelle, 68330 Huningue, Franciaország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Stresnil 40 mg/ml oldatos injekció sertéseknek A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 ml oldat tartalmaz:

Hatóanyag:

Azaperon 40 mg

Segédanyagok:

Nátrium-metabiszulfid 2 mg (E223)

Metil-parahidroxibenzoát 0,5 mg (E218)

Propil-parahidroxibenzoát 0,05 mg (E216)

4. JAVALLAT(OK)

A Stresnil sertések kezelésére alkalmazandó a következő esetekben:

1. Az agresszivitás kezelésére

- átcsoportosítás után az agresszivitás megelőzésére és megszüntetésére
- a kocák agresszivitásának megszüntetésére

2. Egyéb stresszel járó helyzetekben

- a szív túlzott megterhelésének megelőzésére
- szállításkor

3. Szülészetben

4. Anesztézia esetén

- általános anesztézia esetén premedikációra
- helyi anesztéziával kombinálva

5. ELLENJAVALLATOK

Nem javasolt hideg időjárási körülmények között, mivel a perifériás vazodilatáció miatt kardiovaszkuláris kollapszus következhet be.

6. MELLÉKHATÁSOK

A Stresnil az állatok által jól tolerált, széles biztonsági sávval rendelkező készítmény. Nagy dózisok esetén nyálzás és lihegés előfordulhat. Ezek a hatások spontán megszűnnek, maradandó károsodást nem okoznak. Kanokban az 1 mg/ttkg adag túllépése nem javasolt, mert a túladagolás a pénisz relaxációját, következményesen annak sérülését okozhatja.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Agresszivitás

1. Az agresszivitás megelőzésére és megszüntetésére, falkásítás után

2 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg)

2. Agresszív kocák esetén (nem fogadják el újszülött malacukat):

2 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg)Stressz

1. Szívtúlterhelés megelőzése

0,4 mg/ttkg (1 ml/100 ttkg)

Ha elégtelenül reagál az állat, egy második dózis adható 15 perc elteltével.

2. Szállításkor

Süldők szállításakor

0,4 mg/ttkg (elhullás, súlyvesztés csökkentésére) - **2 mg/ttkg** (agresszív viselkedés csökkentésére)

(1 ml/100 ttkg-1 ml/20 ttkg)

Kanok szállításakor

1 mg/ttkg (0,5 ml/20 ttkg)

15-30 perccelállítás előtt kell kezelni az állatokat, majd elkülönítve nyugodt körülmények között tartani a hatás bekövetkeztéig.

Szülészet**2 mg/ttkg (1 ml/20 ttkg)**Premedikációkor anesztéziához**1-2 mg/ttkg (0,5-1 ml/20 ttkg)**

Intramuszkulárisan alkalmazandó.

Egy injekciós helyre legfeljebb 5 ml injekció adható.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Az injekciót minden esetben intramuszkulárisan adjuk a fül mögé, hosszú hipodermális tűvel, a fülhöz a lehető legközelebb, merőlegesen a bőrre. Ha nagy súlyú állatokat rövid tűvel kezelünk, a készítmény egy része a zsírszövetbe kerülhet, ami elégtelen hatást okozhat. Az injekció után az állatoknak javasolt nyugalmat biztosítani, az állatok zavarása az indukciós szakaszban csökkentheti a készítmény hatását.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés hús és egyéb ehető szövetek: 18 nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén, dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni!

A tartály első felbontása után felhasználható: 28 napig.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A túl alacsony dózis szedatív hatású ugyan, de az agresszív viselkedést nem, vagy csak időlegesen szünteti meg. Túl magas dózis esetén szintén előfordulhat agresszivitás a gyógyszer kiürülése után.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A Stresnil, más butirofenonokhoz hasonlóan, az emberre is szedatív hatást gyakorol. Külön figyelmet kell arra fordítani, hogy a készítmény ne kerüljön a szervezetbe. Véletlen öninjekciózás esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását vagy címkéjét.

Vemhesség, laktáció, idején történő alkalmazás:

Vemhesség és laktáció ideje alatt alkalmazható.

Túladagolás:

A Stresnil biztonságos és az állatok által jól tolerált, széles biztonsági sávval rendelkező készítmény. Magas dózisok esetén nyálzás és lihegés előfordulhat. Ezek a hatások spontán megszűnnek, maradandó károsodást

nem okoznak. Kanokban az 1 mg/ttkg adag túllépése nem javasolt, mert a túladagolás a pénisz relaxációját, következményesen annak sérülését okozhatja.

Inkompatibilitások:

Nem keverhető más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2023. július 6.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség: Kizárólag állatorvosi vényre adható ki.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerelés: 100 ml, gumidugóval lezárt szintelen injekciós üvegben.

Törzskönyvi szám:

2564/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)