

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és egyben címke
25 kg-os papírzsák

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Laboratorios Calier, S.A.
Barcelonés, 26 (Pla del Ramassá)
08520 Les Franqueses del Vallés (Barcelona)
Spanyolország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Flubenzim 50 mg/g gyógyszermix sertések és háziyúkok részére A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 g készítmény tartalmaz:

Hatóanyag:

Flubendazol 50 mg

4. JAVALLAT(OK)

Sertés: *Ascaris suum*, *Strongyloides ransomi*, *Hyostrongylus rubidus*, *Oesophagostomum dentatum*, *Trichuris suis*, *Metastrongylus apri* okozta fertőzések kezelésére.

Háziyúk: *Capillaria obsignata*, *Ascaridia galli*, *Syngamus tracheae*, *Heterakis gallinarum*, *Trichostrongylus tenuis*, *Raillettina cestillus* okozta fertőzések kezelésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható a hatóanyaggal, vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismert.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés, háziyúk.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Szájon át, takarmányba keverve alkalmazandó.

Általános adag:

Sertés: 1,2 mg flubendazol/ttkg/nap 7-10 napig.

Háziyúk: 1,8 mg flubendazol/ttkg/nap 7 napig.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A gyógyszeres takarmány bekeverésekor figyelembe kell venni a kezelendő állatok testtömegét és a napi takarmányfogyasztást.

A takarmányfogyasztás olyan tényezőktől függ, mint az életkor, fajta, tenyésztési technológia és az állatok klinikai állapota.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Sertés: Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap.

Háziyúk: Hús és egyéb ehető szövetek: 15 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást termelő madarak kezelésére nem engedélyezett.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Az eredeti csomagolásban tárolandó. Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolási hőmérsékletet nem igényel.

A készítmény felbontás után nem tárolható.

Bekeverés után a takarmánylisztben vagy a pelletált takarmányban felhasználható: 3 hónapig.



12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

A gyógykezelés időtartama alatt az állatok tartási helyét alaposan takarítani kell.

Környezetvédelmi okokból a szabadban tartott háziyúkokat és sertéseket a kezelés ideje alatt és a kezelés után egy napig zárt helyen kell tartani.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések

Ügyelni kell az alábbiak elkerülésére, mivel növelhetik a rezisztencia kialakulásának kockázatát, ezáltal a kezelés eredménytelenségéhez vezethetnek: azonos csoportba tartozó anthelmintikumok túl gyakori és ismételt alkalmazása hosszú időszakon keresztül; aluldozírozás, amely a testtömeg alulbecsülése, a termék helytelen beadása, vagy az adagolóeszköz (ha van) beállításának hiánya miatt lehetséges.

Anthelmintikum-rezisztencia gyanúja esetén megfelelő tesztekkel (pl. a bélsárból peteszám csökkenési teszt) érzékenységi vizsgálatot kell végezni.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A hatóanyagra ismertén túlérzékeny személyek a készítménnyel ne érintkezzenek! A gyógyszeres takarmány bekeverésekor egyéni védőfelszerelés, védőkesztyű, védőruha, porszűrő álarc használata kötelező! Munkavégzés közben enni, inni, dohányozni tilos! Kerülni kell a készítmény bőrrel és nyálkahártyákkal történő közvetlen érintkezését. A készítménnyel való munkavégzés után szappanos vízzel kezlet kell mosni.

Ha túlérzékenységre utaló tünetek jelentkeznek, haladéktalanul orvoshoz kell fordulni bemutatva a készítmény használati utasítását.

Vemhesség, laktáció és tojásrakás idején történő alkalmazás

Az állatgyógyászati készítmény ártalmatlansága nem igazolt vemhesség, laktáció és tojásrakás idején.

Kizárólag a kezelést végző állatorvos által elvégzett előny/kockázat elemzésnek megfelelően alkalmazható.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)

Túladagolás esetén gasztrointesztinális problémák fordulhatnak elő, melyek a kezelés felfüggesztésével megszűnnek.

Inkompatibilitások

Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2022. január 14.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Kiszerezési egységek

25 kg belső LDPE réteggel ellátott többrétegű papírszakban.

Törzskönyvi szám

2743/2/10 MgSzH ÁTI (25 kg)

Lot:

Exp.:

A vonatkozó hivatalos útmutatókat figyelembe kell venni a gyógypremixeknek a kész takarmányba való keverésénél.

