

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Dindoral SPF vakcina

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l'Aviation 69800 Saint Priest, Franciaország

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Dindoral SPF vakcina A.U.V.

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

A vakcina adagonként tartalmaz:

Hatóanyag:

Pulyka vérzéses bélgyulladás vírusa (Domermuth törzs) ≥ 9 E.U*

Segédanyag(ok):

Sovány tejpor ≤ 150 μ g

Nátrium-glutamát ≤ 22 μ g

(*E.U: ELISA Unit: az oltott 10 csirkéből legalább 9 szeropozitívá válik a végtermék hatékonysági vizsgálatban)

4. JAVALLAT(OK)

Broiler pulykák vakcinázása adenovírus okozta vérzéses bélgyulladás (pulyka haemorrhagiás enteritis) ellen.

5. ELLENJAVALLATOK

Tenyészállatok és leendő tenyészállatok nem vakcinázhatók. A vakcina vírus kontakt úton terjed, ezért meg kell akadályozni a tenyész- és tojóállományokba való bekerülését.

Gyöngytyúk csibék nem vakcinázhatók.

6. MELLÉKHATÁSOK

Nem ismert. Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJOK

Pulyka

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Itatásos vakcinázás. Egyszeri immunizálás négyhetes életkorban ivóvízben itatva.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A vakcinát úgy tesszük felhasználhatóvá, hogy egy ivóvízzel teli fecskendő tűjét az üveg gumidugóján keresztül átszúrjuk, a vizet befecskendezzük, majd a teljesen reszuszpendált oltóanyagot felszívjuk a fecskendőbe. Ezt követően a vakcinázáshoz használt ivóvíztartályba kiürítjük az oltóanyagot. A vakcina üvegét kétszer öblítjük ki, hogy az oltóanyagot teljes mértékben visszanyerjük. A vakcina-oldatot közvetlenül felhasználás előtt kell elkészíteni. Feloldás után a vakcina-oldatot tovább kell hígítani az állatok életkorának megfelelő mennyiségű klór- és antiszeptikum-mentes ivóvízben. 1000 állat részére az 1000 adagnak megfelelő fagyasztva szárított oltóanyag-pelletet 1 ml ivóvízben kell visszaoldani, majd annyi ivóvízben, amennyit az állatok 1-2 órán belül el fognak fogyasztani. Az állományt az immunizálás előtt ajánlatos 2 órán keresztül szomjaztatni.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Pulyka (ehető szövetek): Nulla nap.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

+2°C - +8°C között, fénytől védve tárolandó.

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)**A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések**

Csak egészséges állatok vakcinázhatók.

Amennyiben lehetséges, aszeptikus módon kell alkalmazni.

A vakcina oldat készítéséhez csak steril, fertőtlenítőszer mentes eszközök használhatók.

A vakcinázást megelőzően és az azt követő napokban az állatokat stresszhatásoktól óvni kell (szállítás, csörkurtítás).

Csak akkor érdemes vakcinázni, ha a szikellenanyagok már kiürültek.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

Az általános munkavédelmi előírások betartása szükséges. Ha a készítmény a bőrre vagy szembe kerül, alapos vizes öblítés szükséges. Vakcinázás után kezünket és a felszerelést fertőtlenítsük.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók

Nem áll rendelkezésre információ a vakcina más állatgyógyászati készítménnyel történő egyidejű alkalmazásának hatékonyságára és ártalmatlanságra vonatkozóan. A vakcina használata előtt vagy után más állatgyógyászati készítmény alkalmazását az eset megítélésétől függően szükséges eldönteni.

Inkompatibilitások

A víznek, valamint a vakcina elkészítéséhez és szétosztásához használt berendezéseknek fertőtlenítőszerrel és antiszeptikumokkal mentesnek kell lennie. Kompatibilitási vizsgálatok hiányában ezt az állatgyógyászati készítményt tilos keverni más állatgyógyászati készítménnyel.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2020. január 1.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Felhasználhatósági időtartam: 24 hónap.

Kiszárlás: 1000 adagos üveg, 10x1000 adagos üveg, dobozban.

Tk. szám: 2776/1/10 MgSzH-ÁTI (1000 adag)

Vényköteles. Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

Az állatgyógyászati készítménnyel kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez.