

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### 1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, NEVE ÉS CÍME, A KÉPVISELŐ NEVE TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártó:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, Laboratoire Porte des Alpes, rue de l'Aviation 69800 Saint Priest, Franciaország

### 2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY NEVE

Primodog vakcina A.U.V.

### 3. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

A vakcina 1 adagja (1 ml) tartalmaz:

élő, attenuált kutya parvovírus, (Cornell 780916 törzs)

min.  $10^{5.5}$  CCID<sub>50</sub>

Vivőanyag q.s.

1 ml

### 4. JAVALLAT(OK)

Egészséges kutyák aktív immunizálására parvovírus okozta megbetegedés ellen.

### 5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismeretes.

### 6. MELLÉKHATÁSOK

A vakcinázás, más oltóanyagok beadásához hasonlóan, túlérzékenységi állapothoz vezethet. Ilyen esetben tüneti kezelést kell alkalmazni.

### 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya

### 8. ADAGOLÁS ÉS ALKALMAZÁS MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

1 ml, szubkután

### 9. FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

Alapimmunizálás:

1. oltás: 6 hetes életkortól. Fertőzött környezetben 2-3 héttel később meg kell ismételni.

2. oltás: 12 hetes életkortól, klasszikus monovalens vagy polivalens parvovírus vakcinával.

Emlékeztető oltások:

Első emlékeztető oltás: Az alapimmunizálás után egy évvel, klasszikus monovalens vagy kombinált parvovírus vakcinával.

Következő emlékeztető oltás: Két évente, klasszikus monovalens vagy kombinált parvovírus vakcinával. (fertőzött környezetben évente)

### 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

### 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Fénytől védve, 2°C - 8°C között (hűtőszekrényben) tárolandó. Nem fagyasztható.

Gyermekek elől elzárva tartandó.

### 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Csak teljesen egészséges kutyák vakcinázhatók!

A vakcina hatékonysága ellenére egyes állatok nem adnak megfelelő immunválaszt, ha pl. valamely fertőző betegség lappangási stádiumában vannak, alultápláltak, parazitákkal fertőzöttek, szállítás vagy egyéb környezeti stresszhatás alatt állnak.

### 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A kiürült, oltóanyag maradékot tartalmazó üvegeket és az oltáshoz használt eszközöket a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell ártalmatlanítani.

**14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA**  
2020. január 1.

**15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK**

**15.1. RENDELHETŐSÉG**

Vényköteles. Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

**15.2. FORGALMAZHATÓSÁG**

Kizárólag az állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

**15.3. KISZERELÉSI EGYSÉGEK**

1 adag szuszpenzió üvegben, 10 üveg dobozban

1 adag szuszpenzió üvegben, 50 üveg dobozban

**15.4. TÖRZSKÖNYVI SZÁM**

2189/1/07 MgSzH ÁTI (1 adagos)