

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Dehinel Plus Flavour tableta kutyák számára A.U.V.

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártók:

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Horvátország

Virbac S.A., 1ère Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Franciaország

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Dehinel Plus Flavour tableta kutyák számára

prazikvantel, pirantel-embonát, febantel

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

1 tableta tartalmaz:

Prazikvantel	50 mg
Pirantel-embonát	144 mg
Febantel	150 mg

Sárga színű, kerek, mindkét oldalán domború tableta, szemmel látható sötétebb foltokkal, egyik oldalán negyedelő bemetszéssel.

A tableta 2 vagy 4 egyenlő részre osztható (felezhető vagy negyedelhető).

4. JAVALLAT(OK)

Felnőtt és kölyökkutyák fonál-, valamint galandférgek okozta vegyes fertőzéseinek kezelésére:

Fonálférgek

Orsóférgek: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina* (fejlődő és ivarérett alakok)

Kampósférgek: *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum* (kifejlett férgek)

Galandférgek

Galandférgek: *Taenia* fajok, *Dipylidium caninum*

5. ELLENJAVALLATOK

Nem alkalmazható egyidejűleg piperazin vegyületekkel.

Vemhes szukák kezelésekor a megadott dózist nem szabad túllépni.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Nem alkalmazható 2 hetesnél fiatalabb és/vagy 2 kg-nál kisebb testtömegű kutyakölykök esetében.

6. MELLÉKHATÁSOK

Ritkán egyes kutyakölyköknél átmenetileg híg bélsár, hasmenés és/vagy hányás jelentkezhet. Felnőtt kutyáknál nagyon ritkán előfordulhat hányás hasmenéssel vagy anélkül.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon gyakori (10 állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés során)
- gyakori (100 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nem gyakori (1000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- ritka (10000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nagyon ritka (10000 állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is).

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Kutya (kis- és közepes testű).

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Szájon át alkalmazandó.

Adagolás

Javasolt adagok: 15 mg/ttkg febantel, 14,4 mg/ttkg pirantel, és 5 mg/ttkg prazikvantel – ez 10 testtömeg-kilogrammonként 1 tablettával egyenértékű.

Az adagolás pontossága érdekében a tabletták felezhetők/negyedelhetők.

A tabletták közvetlenül, vagy táplálékba rejtve egyaránt beadhatók a kutyának. A termék alkalmazása előtt vagy után az eleséghez való hozzáférést nem szükséges korlátozni.

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A pontos adagolás érdekében az állat testtömegét meg kell mérni.

A kutyakölykök 2 hetes kortól kezdve kéthetenként féregteleníthetők 12 hetes korukig. Ezt követően 3 hónapos időközönként kezelendők. Tanácsos a szukát is kezelni a kölykökkel egyidejűleg.

Toxocara fertőzés kezelésére szoptató szukáknak 2 héttel az ellés után, majd ezt követően kéthetenként kell adni, a kölykök elválasztásáig.

Általános féregtelenítésre 3 hónapos időközönként egyszeri dózis adása javasolt. Súlyos fonálféreg fertőzés esetén 14 nap elteltével ismételt kezelés javasolt.

10. ÉLELMÉZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nem értelmezhető.

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A bolhák egy gyakori galandféreg faj, a *Dipylidium caninum* köztigazdái. A galandféreg fertőzés nagy valószínűséggel kiújul, ha egyidejűleg a köztigazdák (pl. bolha, egér, stb.) elleni kezelés elmarad.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Minden tablettá maradványt meg kell semmisíteni.

Nem alkalmazható 2 hetesnél fiatalabb és/vagy 2 kg-nál kisebb testtömegű kutyakölykök esetében.

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A megfelelő higiéné érdekében, a tablettá beadását (közvetlenül vagy táplálékba keverve) követően alaposan kezét kell mosni.

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás:

Vemhes állatok fonálférgességének kezelése előtt állatorvos tanácsát kell kérni.

A termék alkalmazható a szoptatás során.

Nem alkalmazható szukákon a vemhesség első kétharmadában.

Gyógyszerkölcsonhatások és egyéb interakciók:

Nem kombinálható piperazinnal, mert a pirantel és a (számos kutya-féregtelenítő termékben alkalmazott) piperazin egymás hatását antagonizálhatja.

Egyidejű alkalmazása más kolinerg vegyülettel toxicitáshoz vezethet.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A benzimidazolok széles terápiás sávval rendelkező vegyületek. A pirantel a szisztémás vérkeringésbe nem szívódik fel. A prazikvantel szintén széles terápiás sávval rendelkezik, ötszörös túladagolás sem okoz klinikai tüneteket.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2020. május 28.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 2 tablett (1 fólia-levélben 2 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 4 tablett (2 fólia-levélben 2 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 10 tablett (1 fólia-levélben 10 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 30 tablett (3 fólia-levélben 10 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 50 tablett (5 fólia-levélben 10 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 100 tablett (10 fólia-levélben 10 tablett), dobozban.

Nyomtatott-perforált Al/Al buborékfólia: 300 tablett (30 fólia-levélben 10 tablett), dobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerezés kerül kereskedelmi forgalomba.

*Csak a 100 tablettás kiszerezésre vonatkozik

1 tablett/ 10 kg

ÁLLATORVOS PECSÉTJE

Tulajdonos neve:.....

.....

Kutya:.....

.....

Adagolás:.....

.....

