

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**  
**Dehinel Plus XL tabletta kutyák számára A.U.V.**

**1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME**

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia

A gyártási tételek felszabadításáért felelős gyártók:

KRKA - FARMA d.o.o.  
V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Horvátország

Virbac S.A.  
1ère Avenue, 2065M, LID, 06516 Carros Cedex, Franciaország

KRKA, d.d., Novo mesto  
Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia

**2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Dehinel Plus XL tabletta kutyák számára A.U.V.  
*prazikvantel, pirantel-embonát, febantel*

**3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE**

1 tabletta tartalmaz:

Prazikvantel	175 mg
Pirantel-embonát	504 mg
Febantel	525 mg

Ovális, enyhén zöldessárga, mindkét oldalán domború felületű, ferde szélű tabletta.  
A tabletta egyenlő részekre osztható (felezhető).

**4. JAVALLAT(OK)**

Felnőtt kutyák fonál-, valamint galandférgek okozta vegyes fertőzések kezelésére:  
*Fonálférgek*

Orsóférgek: *Toxocara canis, Toxascaris leonina* (fejődő és ivarérett alakok)

Kampósférgek: *Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum* (kifejlett férgek)

*Galandférgek*

Galandférgek: *Taenia* fajok, *Dipylidium caninum*



**5. ELLENJAVALLATOK**

Nem alkalmazható egyidejűleg piperazin vegyületekkel.

Nem alkalmazható a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni túlérzékenység esetén.

Vemhes szukák kezelésekor a megadott dózist nem szabad túllépni.

**6. MELLÉKHATÁSOK**

Nagyon ritkán előfordulhat hányás hasmenéssel vagy anélkül.

A mellékhatások gyakoriságát az alábbi útmutatás szerint kell meghatározni:

- nagyon gyakori (10 állatból több mint 1-nél jelentkezik egy kezelés során)
- gyakori (100 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nem gyakori (1000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- ritka (10000 állatból több mint 1-nél, de kevesebb mint 10-nél jelentkezik)
- nagyon ritka (10000 állatból kevesebb mint 1-nél jelentkezik, beleértve az izolált eseteket is).

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

## 7. CÉLÁLLAT FAJOK

Kutya (nagy- és óriás testű).

## 8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Szájon át alkalmazandó.

### Adagolás

Javasolt adagok: 15 mg/ttkg febantel, 14,4 mg/ttkg pirantel, és 5 mg/ttkg prazikvantel – ez 35 testtömeg-kilogrammonként 1 tablettával egyenértékű.

A tabletták felezhetők.

A termék alkalmazása előtt vagy után az eleséghez való hozzáférést nem szükséges korlátozni. A tabletták közvetlenül, vagy táplálékba rejtve egyaránt beadhatók a kutyának.

## 9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

A pontos adagolás érdekében az állat testtömegét meg kell mérni.

*Toxocara* fertőzés kezelésére szoptató szukáknak 2 héttel az ellés után, majd ezt követően kéthetenként kell adni, a kölykök elválasztásáig. Súlyos fonálféreg fertőzés esetén 14 nap elteltével meg kell ismételni a kezelést.

Kifejlett kutyák általános féregtelenítését 3 hónapos időközönként szükséges elvégezni.

## 10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Nem értelmezhető.

## 11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni.

Ez az állatgyógyászati készítmény különleges tárolást nem igényel.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a dobozon feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni! A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

## 12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Különleges figyelmeztetések minden célállat fajra vonatkozóan:

A bolhák egy gyakori galandféreg faj, a *Dipylidium caninum* köztigazdái. A galandféreg fertőzés nagy valószínűséggel kiújul, ha egyidejűleg a köztigazdák (pl. bolha, egér, stb.) elleni kezelés elmarad.

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

Ezt a terméket nem ajánlott 17,5 kg alatti testsúlyú kutyákon alkalmazni.

Minden tablettá maradványt meg kell semmisíteni.



Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

A megfelelő higiéné érdekében, a tabletták beadását (közvetlenül vagy táplálékba keverve) követően alaposan kezni kell mosni.

Véletlen lenyelés esetén haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, bemutatva a készítmény használati utasítását.

Vemhesség, laktáció idején történő alkalmazás:

Vemhes állatok fonálférgességének kezelése előtt állatorvos tanácsát kell kérni.

A termék alkalmazható a szoptatás során.

Nem alkalmazható szukákon a vemhesség első kétharmadában.

Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók:

Nem kombinálható piperazinnal, mert a pirantel és a (számos kutya-féregtelenítő termékben alkalmazott) piperazin egymás hatását antagonizálhatja.

Egyidejű alkalmazása más kolinerg vegyülettel toxicitáshoz vezethet.

Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok):

A kutyák a készítményt jól tolerálják. A toxicitási vizsgálatok során az ajánlott dózis legfeljebb ötszöröse esetenként hányást okozott.

### 13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekből származó hulladék anyagokat a helyi követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

### 14. HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2019. március 13.

### 15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 2 tabletták (1 fólia-levelelben 2 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 4 tabletták (2 fólia-levelelben 2 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 10 tabletták (1 fólia-levelelben 10 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 12 tabletták (2 fólia-levelelben 6 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 24 tabletták (4 fólia-levelelben 6 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 30 tabletták (3 fólia-levelelben 10 tabletták, vagy 5 fólia-levelelben 6 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 50 tabletták (5 fólia-levelelben 10 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 60 tabletták (10 fólia-levelelben 6 tabletták, vagy 6 fólia-levelelben 10 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 100 tabletták (10 fólia-levelelben 10 tabletták), dobozban.

Nyomatott-perforált Al/Al buborékfólia: 102 tabletták (17 fólia-levelelben 6 tabletták), dobozban.

Előfordulhat, hogy nem minden kiserelés kerül kereskedelmi forgalomba.

\*Csak a 60 tablettás kiserelésre vonatkozik

1 tabletták/ 35 kg

### ÁLLATORVOS PECSÉTJE

Tulajdonos neve: .....

Kutya: .....

Adagolás: .....

