

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Tasakokat tartalmazó DOBOZ címkéje (2 x 20 g, 24 x 20 g, 2 x 50 g, 24 x 50 g, 1 x 100 g, 5 x 100 g, 25 x 100 g)

1. ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FLIMABEND 100 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Grammonként 100 mg flubendazolt tartalmaz.

3. KISZERELESI EGYSÉG

2 x 20 g
24 x 20 g
2 x 50 g
24 x 50 g
1 x 100 g
5 x 100 g
25 x 100 g

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés (malacok, hízósertések, vemhes és szoptató kocák) és házityúk (tojótyúkok, tenyészttyúkok, jércék, brojlersirkék).



5. JAVALLATOK

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Ivóvízben történő alkalmazásra.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek):

- adag: 1 mg/ttkg 5 napon át: 3 nap

- adag: 2,5 mg/ttkg 2 napon át: 4 nap

Házityúk (hús és egyéb ehető szövetek): 2 nap

Tojás: nulla nap

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp

A tasak első felbontása után felhasználható: azonnal felhasználandó.

Az első felbontás után a tasakban maradt, fel nem használt szuszpenziót meg kell semmisíteni.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óráig.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK
--

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

KRKA

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3320/1/13 NÉBIH ÁTI (20 g-os tasak)

3320/2/13 NÉBIH ÁTI (50 g-os tasak)

3320/3/13 NÉBIH ÁTI (100 g-os tasak)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Tartályokat tartalmazó DOBOZ címkéje (4x 750 g, 6 x 750 g)

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FLIMABEND 100 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Grammonként 100 mg flubendazolt tartalmaz.

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

4 x 750 g

6 x 750 g

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés (malacok, hízosertések, vemhes és szoptató kocák) és házityúk (tojótyúkok, tenyészttyúkok, jércék, brojlersirkék).



5. JAVALLATOK

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Ivóvízben történő alkalmazásra.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek):

- adag: 1 mg/ttkg 5 napon át: 3 nap

- adag: 2,5 mg/ttkg 2 napon át: 4 nap

Házityúk (hús és egyéb ehető szövetek): 2 nap

Tojás: nulla nap

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp

A tartály első felbontása után felhasználható: 6 hónapig.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óráig.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK
--

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

KRKA

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3320/4/13 NÉBIH ÁTI (750 g-os tartály)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Címke -(20 g-os, 50 g-os, 100 g-os tasak)

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FLIMABEND 100 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Grammonként 100 mg flubendazolt tartalmaz.

3. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés (malacok, hízosertések, vemhes és szoptató kocák) és házityúk (tojótyúkok, tenyészttyúkok, jércék, brojlersirkék).



4. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

Ivóvízben történő alkalmazásra.

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek):

- adag: 1 mg/ttkg 5 napon át: 3 nap

- adag: 2,5 mg/ttkg 2 napon át: 4 nap

Házityúk (hús és egyéb ehető szövetek): 2 nap

Tojás: nulla nap

6. LEJÁRATI IDŐ

Exp

A tasak első felbontása után felhasználható: azonnal felhasználandó.

Az első felbontás után a tasakban maradt, fel nem használt szuszpenziót meg kell semmisíteni.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óráig.

A gyártási tétel számát és a lejáratit időt lásd a tasak lezárt szélén.

7. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

8. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE
--

KRKA

9. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

Címke (750 g-os tartály)

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

FLIMABEND 100 mg/g szuszpenzió ivóvízbe keveréshez

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Grammonként 100 mg flubendazolt tartalmaz.

3. CÉLÁLLAT FAJOK

Sertés (malacok, hízósertések, vemhes és szoptató kocák) és házityúk (tojótyúkok, tenyészttyúkok, jércék, brojlersirkék).



4. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

Ivóvízben történő alkalmazásra.

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élrelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Sertés (hús és egyéb ehető szövetek):

- adag: 1 mg/ttkg 5 napon át: 3 nap
- adag: 2,5 mg/ttkg 2 napon át: 4 nap

Házityúk (hús és egyéb ehető szövetek): 2 nap

Tojás: nulla nap

6. LEJÁRATI IDŐ

Exp

A tartály első felbontása után felhasználható: 6 hónapig.

Az előírás szerinti hígítás után felhasználható: 24 óráig.

7. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

8. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

KRKA

9. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot