

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GRIPORK

Szuszipenziós injekció sertéseknek

1. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓNAK A NEVE ÉS CÍME

Az eseti forgalombahozatali engedély jogosultja:

Dunavet-B Zrt.

7020 Dunaföldvár, Ady Endre u. 5-9.

A gyártási tételek felszabadításért felelős gyártó:

Laboratorios Hipra, S.A.

Avda. la Selva, 135.

17170 AMER (Girona) Spain.

Tel. 972 43 06 60 - Fax 972 43 06 61

E-mail: hipra@hipra.com

2. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

GRIPORK

Szuszipenziós injekció sertéseknek

3. HATÓANYAGOK ÉS EGYÉB ÖSSZETEVŐK MEGNEVEZÉSE

Egy adag (2 ml) tartalmaz:

Hatóanyag(ok):

Inaktivált sertés influenza vírus, A(H1N1)OLL törzs $\geq 1/50$ IHA*

Inaktivált sertés influenza vírus, A(H3N2)G törzs $\geq 1/50$ IHA*

* Hemagglutináció gátlási titer

Adjuváns(ok):

Folyékony paraffin.....424.00 mg

Alumínium-hidroxid..... 48.00 mg

Segédanyag(ok):

Metil-parahidroxibenzoát, nátrium sója..... 2.00 mg

Propil-parahidroxibenzoát, nátrium sója..... 0.40 mg

4. JAVALLAT(OK)

Egészséges állatok aktív immunizálására a sertés influenza megelőzésére.

5. ELLENJAVALLATOK

Nem ismertek.

6. MELLÉKHATÁSOK

- A vakcinázott állatokban egyedi túlérzékenységi reakciók előfordulhatnak, jelentkezésükkor alkalmazzon antihisztamint.
- Nem megfelelő (szubkután) alkalmazáskor helyi tünetek jelentkezhetnek, melyek néhány nap alatt elmúlnak.
- Néhány állatnál az adjuvánsok helyi reakciókat okozhatnak, melyek néhány nap alatt elmúlnak.

Ha súlyos nemkívánatos hatást vagy egyéb, ebben a használati utasításban nem szereplő hatásokat észlel, értesítse erről a kezelő állatorvost!

7. CÉLÁLLAT FAJ(OK)

Sertés, (Kocák, kanok, választott malacok és növendék sertések).
Egy hónapos életkortól.

8. ADAGOLÁS, ALKALMAZÁSI MÓD(OK) CÉLÁLLAT FAJONKÉNT

Sertés: 2 ml/állat egy hónapos életkortól.

ALKALMAZÁSI MÓD:

Intramuszkuláris alkalmazás, mélyen a nyaki izmokba, a fül mögött.

AJÁNLOTT VAKCINÁZÁSI SÉMA:

Kocák:

Alapimmunizálás: mindegyik állatnak 2 ml vakcinát kell beadni, tekintet nélkül arra, hogy vemhes vagy szoptat-e, majd ezt 21 nappal később megismételni. Emlékeztető oltás: 2 ml vakcinával minden vemhesség alatt, nagyjából ellés után 1 hónappal, vagy rendszeresen, minden 6. hónapban.

Kanok:

Alapimmunizálás: első alkalommal 2 ml vakcinát kell beadni, majd ezt 21 nap múlva megismételni. Emlékeztető oltás: 6 havonta.

Választott malacok:

Alapimmunizálás: 30-40 naposan fél adag (1 ml) vakcinát kell beadni, majd 60-65 naposan egy adag (2 ml) vakcinával újra oltani.

Növendék sertések:

Alapimmunizálás: az állatok érkezésekor fél adag (1 ml) vakcinát kell beadni, majd 3 héttel később teljes adagot (2 ml).

9. A HELYES ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ JAVASLAT

Csak egészséges állatok olthatók be.

Miután a vakcina több adagos injekciós üvegben kerül forgalomba, az üveg kinyitása után a benne lévő összes vakcinát fel kell használni.

Steril eszközökkel vakcinázzon.

A beadás helyét fertőtleníteni kell.

Használat előtt felrázandó.

Beadás előtt a vakcinának szobahőmérsékletre (15-25 °C-ra) kell melegednie.

10. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ(K)

Nulla nap

11. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

Hűtve (2°C – 8°C) tárolandó és szállítandó.

Nem fagyasztható.

Fénytől védve tartandó.

Ezt az állatgyógyászati készítményt csak a címkén az EXP után feltüntetett lejáratidőn belül szabad felhasználni!

Lejáratidő az üveg első kibontása után: azonnal felhasználandó.

12. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Az állatok kezelését végző személyre vonatkozó különleges óvintézkedések

A kezelést végző személynek:

A készítmény ásványi olajat tartalmaz. A véletlen vagy öninjekciózás akut fájdalmat és gyulladást okozhat, különösen akkor, ha az ízületbe vagy ujjba történt, és kivételes esetekben az érintett ujj elvesztését okozhatja, ha nem kap sürgős orvosi segítséget.

Ha véletlenül beadta magának ezt a gyógyszert, sürgősen kérjen orvosi segítséget, még akkor is, ha csak nagyon kis mennyiséget adott be, és vigye magával a beteg tájékoztatót.

Ha a fájdalom az orvosi vizsgálat után több, mint 12 óráig fennáll, forduljon ismét orvoshoz.

Az orvosnak:

Ez a termék ásványi olajat tartalmaz. Még ha csak kis mennyiséget adtak is be, ennek a gyógyszernek a véletlenszerű befecskendezése intenzív gyulladást okozhat, amely például ischémiás nekrozishoz vezethet, és akár az ujj elvesztését is eredményezheti. AZONNALI sebészeti beavatkozást igényel, mivel szükség lehet a terület azonnali bemetszésére és irrigálására, különösen akkor, ha az ujj vagy a szalag lágy részei érintettek.

13. A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKAINAK ÁRTALMATLANNÁ TÉTELÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

Az állatgyógyászati készítmény nem kerülhet sem a szennyvízbe, sem a háztartási hulladékba!

Kérdezze meg a kezelő állatorvost, gyógyszerészt, hogy milyen módon semmisítse meg a továbbiakban nem szükséges állatgyógyászati készítményeket! Ezek az intézkedések a környezetet védik.

14. A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK IDŐPONTJA

2024. december 20.

15. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Kiszerezések:

Kartondoboz 10 db 10 adagos injekciós üveggel (20 ml).

Kartondoboz 1 db 50 adagos injekciós üveggel (100 ml).

Előfordulhat, hogy nem minden kiszerelés kerül kereskedelmi forgalomba

Kizárólag állatorvosi vényre kiadható gyógyszer.

Kizárólag állatorvosi felügyelettel alkalmazható.

Eseti engedély száma: 5300/110483-2/2024

